

Hjälpdokument för MS-diagnos

Kriterer för dissemination i rum (DIR) enligt reviderade McDonaldkriterier 2010 vid skovdebut:

DIR föreligger vid minst en (1) lesion på minst två av fyra MS-typiska lokaler (juxtakortikalt, periventrikulärt, infratentoriellt samt spinalt).

Undantag: Om den symtomgivande lesionen är spinal eller infratentoriell ingår inte dessa för beräkning av DIR
Lesionerna skall vara > 3 mm

Kriterer för dissemination i tid (DIT) enligt reviderade McDonaldkriterier 2010 vid skovdebut:

1. En ny T2 och/eller Gd-laddande lesion(er) på uppföljande MRI i jämförelse med en baseline undersökning, *oavsett* när baseline MRI-undersökningen är gjord
2. Samtidig förekomst av asymtomatiska Gd-laddande och icke kontrastladdande lesioner *vid vilket tillfälle som helst* ("at any time")

Kriterer för primärprogressiv MS enligt reviderade McDonald 2010 :

1. Ett år av progressiv utveckling av neurologiska symtom, prospektivt eller retrospektivt
2. Plus två av följande tre:
 - I. Bevis för DIS i hjärnan genom minst en T2-lesion på två av tre MS-typiska lokaler (juxtakortikal, periventrikulärt, infratentoriellt)
 - II. Bevis för DIS spinalt genom minst två lesioner i ryggmärgen
 - III. Positiv CSF genom OCB eller förhöjt IgG-index
 - Symptomatiska lesioner i hjärnstam eller spinalt räknas inte in i ovanstående

Polman, C.H., et al., *Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria*. Annals of neurology, 2011. **69**(2): p. 292-302.